

アップニーク®ミニ点眼液 0.1%による眼瞼下垂の治療について

後天性眼瞼下垂は、加齢などのさまざまな原因によって上まぶたの筋肉の力が伝わりにくくなることで、引き起こされます。

アップニークミニ点眼液 0.1%（有効成分：オキシメタゾリン塩酸塩）は、まぶたを持ち上げる筋肉のひとつであるミュラー筋を収縮させる作用があります。

効果は、通常翌日には消失していますので、継続して点眼する必要があります。

副作用として、点眼後にまぶたのかゆみを感じることがあります。また、点眼後、一時的に目がかすんだり、まぶしく見えたりすることがあります。

以下の項目にあてはまる方は、必ず医師にご相談ください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・心血管系疾患がある
- ・閉塞隅角緑内障である
- ・妊娠または授乳中である
- ・他に薬を使っている

治療に用いる薬剤

- ・名称 : アップニーク®ミニ点眼液 0.1%

治療スケジュール・費用

検査後、適応と判断されれば治療開始となります。

治療継続中は定期的に有効性、安全性のモニタリングを行います。

治療は事前予約が必要です。

（ご希望の方は事前に083-250-1008にご連絡ください）

検査・薬剤費用は全て自由診療（公的医療保険の対象外）となります。

	費用（税込）
希望時 1箱～3箱まで 1箱(30本/1か月分)	診察費用（1,650円）+点眼薬費用（5,000円/1箱）

注）アップニーク®ミニ点眼液 0.1%による治療は自由診療です。

なお、副作用等で治療を中止した場合でも、一旦処方した点眼薬については原則、返品・返金に応じることはできない旨、あらかじめご了承ください。

問合せ先

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

医療法人社団こん眼科 TEL 083-250-1008